“Colesterolo buono, colesterolo cattivo e rischio cardiovascolare: facciamo chiarezza”

Villar Dora, 27 Settembre 2019

Lipidi o Grassi

- Ruolo fondamentale nella produzione di energia per l'organismo umano
- Il metabolismo lipidico produce 37KJ/g rispetto ai 18 KJ/g di carboidrati e proteine
- Un uomo di 70 Kg può immagazzinare 400.000 KJ di energia sotto forma di grassi, 100.000 KJ sotto forma di proteine, 2500 KJ sotto forma di glicogeno e 180 KJ sotto forma di glucosio.
- Il 90% dei lipidi si trova sotto forma di TRIGLICERIDI (lipidi semplici)
- Il 10% è rappresentato da steroidi (COLESTEROLO) e lipidi complessi (glicolipidi, sfingolipidi)

TRIGLICERIDI

Una molecola di glicerolo legata a tre molecole di acidi grassi

FUNZIONI

Produzione di energia
Produzione di calore
Isolamento termico

Trigliceride

COLESTEROLO

Quattro anelli carboniosi legati tra loro ed una coda idrocarburica

FUNZIONI

- Costituente delle membrane cellulari (25%)
- Costituente della guaina mielinica dei nervi
- Precursore dei Sali biliari
- Precursore di vitamine (D, E)
- Precursore di ormoni
- Essenziale per lo sviluppo embrionale

COLESTEROLO E
TRIGLICERIDI
FONDAMENTALI
PER LA VITA!

Da dove provengono i grassi?

TRIGLICERIDI

- Produzione endogena da parte del fegato (30%)
- Introdotti con gli alimenti (70%)

COLESTEROLO

- Produzione endogena (70%) da parte del **fegato**, intestino, surrene, gonadi, cervello, cute
- Introdotti con gli alimenti (30%)

Alimenti contenenti grassi: carni rosse, salumi, insaccati, formaggi stagionati, burro, margarina, alcolici (vino, birra), dolci, uova (tuorlo), molluschi e crostacei, frittura

Metabolismo glicidico (pasta, pane, zuccheri) e lipidico sono connessi!

Metabolic pathways of lipoproteins

I grassi sono liposolubili

- Non possono circolare liberi all'interno del flusso sanguigno
- Circolano legati a proteine di trasporto sotto forma di LIPOPROTEINE e CHILOMICRONI
- HDL: lipoproteine ad alta densità > trasportano il colesterolo dai tessuti al fegato
- LDL: lipoproteine a bassa densità > trasportano il colesterolo dal fegato ai tessuti
- Il colesterolo-LDL è responsabile della formazione di placche aterosclerotiche

Colesterolo "Cattivo" - LDL

Le LDL, al contrario, depositano il colesterolo in eccesso sulle pareti delle arterie, favorendo così la formazione delle placche. Per questo, il colesterolo LDL è definito "cattivo".

Colesterolo "Buono" - HDL

Le HDL prelevano il colesterolo dalle pareti delle arterie, ostacolando la formazione delle placche aterosclerotiche. Ecco perché il colesterolo HDL è comunemente detto "buono".

Gli esami del sangue

- Routine: emocromo con formula leucocitaria, glicemia, creatinina, COLESTEROLO TOTALE, COLESTEROLO HDL, TRIGLICERIDI, alt (alanino-aminotranferasi), esame urine completo
- COLESTEROLO TOTALE
- COLESTEROLO HDL – “BUONO”
- TRIGLICERIDI
- COLESTEROLO LDL – “CATTIVO”

$$LDL = CT - HDL - \frac{TG}{5}$$

Se Trigliceridi $\leq$ 150 mg/dl

Formula di Friedewald

Perché il colesterolo alto ci spaventa?

- Il colesterolo in eccesso, sotto forma di LDL-Colesterolo, si deposita a livello delle arterie e forma una placca tra endotelio e tonaca intima
- La placca si organizza, cresce di dimensioni e può ulcerarsi con conseguente richiamo delle piastrine e formazione di un trombo
- Il trombo può staccarsi e, diventato embolo, può migrare e occludere arterie cerebrali (ictus) o coronarie (infarto)

Patogenesi dell'ATEROSCLEROSI

Classificazione delle iperlipidemie

- Linee guida dell'*European Atherosclerosis Society* per la classificazione delle iperlipidemie

Iperlipidemia	Concentrazione plasmatica di lipidi
Ipercolesterolemia	
Lieve	Colesterolo totale: 5,2-6,5 mmol/L (200-250 mg/dL)
Moderata	Colesterolo totale: 6,5-7,8 mmol/L (250-300 mg/dL)
Grave	Colesterolo totale: >7,8 mmol/L (>300 mg/dL)
Ipertrigliceridemia	
Moderata	Trigliceridi: 2,3-4,6 mmol/L (200-400 mg/dL)
Grave	Trigliceridi: >4,6 mmol/L (>400 mg/dL)

- Nell'iperlipidemia mista, colesterolo totale e trigliceridi sono entrambi elevati

La situazione in Italia

Condizioni a rischio – Italia

Periodo: 1998–2002 – Et: 35–74

Livello di istruzione: Tutti

I soli valori numerici non bastano..bisogna calcolare il RISCHIO CARDIOVASCOLARE!

- Concetto di RISCHIO CARDIOVASCOLARE!
- ESPRIME LA PROBABILITA' DI AMMALARSI DI MALATTIA CARDIOVASCOLARE NEI PROSSIMI 10 ANNI
- Non considera soltanto i valori dei grassi nel sangue ma va adattato alla singola persona
- Calcolato tramite algoritmo matematico sulla base dei fattori di rischio individuali.
- **FATTORI DI RISCHIO NON MODIFICABILI: età, genere, familiarità**
- **FATTORI DI RISCHIO MODIFICABILI: fumo, presenza di diabete, livelli di colesterolo totale e hdl, pressione arteriosa**
- Carte del rischio cardiovascolare come strumento operativo a disposizione del medico (gestionali)

LE CARTE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE

DONNE NON DIABETICHE

UOMINI NON DIABETICI

DONNE DIABETICHE

UOMINI DIABETICI

livello di rischio a 10 anni

rischio MCV	VI		oltre	30%
rischio MCV	V		20% -	30%
rischio MCV	IV		15% -	20%
rischio MCV	III		10% -	15%
rischio MCV	II		5% -	10%
rischio MCV	I		meno	5%

Esempio: rischio 5% indica che da oggi ai prossimi 10 anni 5 persone su 100 con le stesse caratteristiche possono ammalarsi

Età: il rischio aumenta progressivamente con l'avanzare dell'età

Sesso maschile: gli uomini sono più a rischio delle donne. Nella donna il rischio aumenta sensibilmente dopo la menopausa

Familiarità: parenti con eventi cardiovascolari in età giovanile (meno di 55 anni negli uomini e di 65 nelle donne).

Fumo: aumenta il rischio cardiovascolare

Pressione arteriosa: Una pressione arteriosa elevata richiede al cuore a un maggior carico di lavoro e favorisce la formazione di [aterosclerosi](#) nelle pareti delle arterie.

Colesterolemia totale. Maggiore è la sua quantità, più alto è il rischio che si depositi nelle pareti delle arterie

Diabete: se non correttamente controllato favorisce l'[aterosclerosi](#)

CARTE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE SECONDO EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

Ricorda!

- Gli esami del sangue sono importantissimi ma da soli non bastano!
- Servono ad identificare il rischio cardiovascolare
- Il rischio cardiovascolare NON dipende solo dagli esami del sangue ma dalla situazione clinica della singola persona: diabete, fumo e/o alcol, pressione, presenza di arteriopatie periferiche, funzionalità renale, farmaci assunti, familiarità, precedenti episodi ischemici miocardici o cerebrali
- Deve sempre essere INDIVIDUALIZZATO!
- **Strumento fondamentale per il medico per assumere decisioni: quale terapia? Dietetica, comportamentale, farmacologica?**

• **Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta, seguita per almeno 3 mesi, e ipercolesterolemia poligenica**

	CATEGORIE DI RISCHIO	TARGET	Trattamento di 1° livello	Trattamento di 2° livello
Ipolipemizzanti: Fibrati <ul style="list-style-type: none"> • bezafibrato • fenofibrato • gemfibrozil 	Pazienti con Rischio <u>Medio</u> <ul style="list-style-type: none"> • Risk SCORE 2 - 3% 	C-LDL <130 mg/dl	Modifica dello stile di vita per almeno 6 mesi	<ul style="list-style-type: none"> • simvastatina • pravastatina • fluvastatina • lovastatina • atorvastatina (**)
Statine <ul style="list-style-type: none"> • simvastatina • pravastatina • fluvastatina • lovastatina • atorvastatina • rosuvastatina 	Pazienti con Rischio <u>Moderato</u> <ul style="list-style-type: none"> • Risk SCORE 4 - 5% 	C-LDL <115 mg/dl	<ul style="list-style-type: none"> • simvastatina • pravastatina • fluvastatina • lovastatina • atorvastatina (**) 	
Altri <ul style="list-style-type: none"> • PUFA-N3(***) • Ezetimibe 	Pazienti con Rischio <u>Alto</u> <ul style="list-style-type: none"> • Risk SCORE >5% e <10% • Dislipidemie familiari • Ipertensione severa • Diabetici senza fattori rischio CV e senza danno d'organo • Pazienti con IRC moderata (FG 30-59 ml/min) 	C-LDL <100 mg/dl	<ul style="list-style-type: none"> • simvastatina • pravastatina • fluvastatina • lovastatina • atorvastatina (**) Preferenzialmente atorvastatina se necessaria riduzione LDL >50%	<ul style="list-style-type: none"> • rosuvastatina • Ezetimibe più statine (in associazione estemporanea o preconstituita) (**)
	Pazienti con Rischio <u>Molto Alto</u> <ul style="list-style-type: none"> • Risk SCORE >10% • Malattia coronarica • Stroke ischemico • Arteropatie periferiche • Progresso IMA • Bypass aorto-coronarico • Diabetici con 1 o più fattori di rischio CV e/o markers di danno d'organo • Pazienti con IRC grave (FG 15-29 ml/min) 	C-LDL <70 mg/dl (riduzione di almeno il 50% del C-LDL)	<ul style="list-style-type: none"> • atorvastatina § • pravastatina • fluvastatina • lovastatina • simvastatina (**) Rosuvastatina nei pazienti in cui ci sia stata evidenza di EA severi nei primi 6 mesi di terapia con altre statine	Ezetimibe più statine (in associazione estemporanea o preconstituita) (**)
	Pazienti in trattamento con statine con HDL basse (<40 mg nei M e <50 mg nelle F) e/o TG elevati (>200mg/dl)		Fibrati (prima scelta fenofibrato)	

(**) Nei pazienti che siano intolleranti alle statine, per il conseguimento del target terapeutico è rimborsato il trattamento con ezetimibe in monoterapia.

§ Nei pazienti con sindromi coronariche acute o in quelli sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione percutanea è indicata atorvastatina a dosaggio elevato (≥40 mg)

Total CV risk (SCORE) %		Untreated LDL-C levels					
		<1.4 mmol/L (55 mg/dL)	1.4 to <1.8 mmol/L (55 to <70 mg/dL)	1.8 to <2.6 mmol/L (70 to <100 mg/dL)	2.6 to <3.0 mmol/L (100 to <116 mg/dL)	3.0 to <4.9 mmol/L (116 to <190 mg/dL)	≥4.9 mmol/L (≥190 mg/dL)
Primary prevention	<1, low-risk	Lifestyle advice	Lifestyle advice	Lifestyle advice	Lifestyle advice	Lifestyle intervention, consider adding drug if uncontrolled	Lifestyle intervention and concomitant drug intervention
	Class ^a /Level ^b	I/C	I/C	I/C	I/C	IIa/A	IIa/A
	≤1 to <5, or moderate risk (see Table 4)	Lifestyle advice	Lifestyle advice	Lifestyle advice	Lifestyle intervention, consider adding drug if uncontrolled	Lifestyle intervention, consider adding drug if uncontrolled	Lifestyle intervention and concomitant drug intervention
	Class ^a /Level ^b	I/C	I/C	IIa/A	IIa/A	IIa/A	IIa/A
	≤5 to <10, or high-risk (see Table 4)	Lifestyle advice	Lifestyle advice	Lifestyle intervention, consider adding drug if uncontrolled	Lifestyle intervention and concomitant drug intervention	Lifestyle intervention and concomitant drug intervention	Lifestyle intervention and concomitant drug intervention
	Class ^a /Level ^b	IIa/A	IIa/A	IIa/A	I/A	I/A	I/A
	≤10, or at very-high risk due to a risk condition (see Table 4)	Lifestyle advice	Lifestyle intervention, consider adding drug if uncontrolled	Lifestyle intervention and concomitant drug intervention	Lifestyle intervention and concomitant drug intervention	Lifestyle intervention and concomitant drug intervention	Lifestyle intervention and concomitant drug intervention
Class ^a /Level ^b	IIa/B	IIa/A	I/A	I/A	I/A	I/A	
Secondary prevention	Very-high-risk	Lifestyle intervention, consider adding drug if uncontrolled	Lifestyle intervention and concomitant drug intervention	Lifestyle intervention and concomitant drug intervention			
	Class ^a /Level ^b	IIa/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A

Non solo la dieta, non solo la produzione endogena: un innalzamento di colesterolo e/o trigliceridi può essere secondario ad altre cause!

Forma di dislipidemia	Cause
Ipercolesterolemia	<ul style="list-style-type: none">• Epatopatie ostruttive• Farmaci: progestinici, ciclosporina, tiazidi• Ipotiroidismo• Porfiria acuta intermittente• Sindrome nefrosica
Ipertrigliceridemia	<ul style="list-style-type: none">• Alcool• Diabete mellito• Epatite acuta• Farmaci: estrogeni, isotretinoina, beta bloccanti, glucocorticoidi, resine chelanti gli acidi biliari, tiazidi• Gammopatie monoclonali: mieloma multiplo, linfomi• Glicogenosi• Gravidanza• Insufficienza renale cronica• Interventi di bypass ileale• Lipodistrofia• Lupus eritematoso sistemico• Obesità• Sepsi• Stress
HDL ridotte	<ul style="list-style-type: none">• Farmaci: beta-bloccanti, steroidi anabolizzanti• Fumo di tabacco• Malnutrizione• Obesità

Iperlipidemie familiari

- Vanno sospettate se Colesterolo totale > 300 mg/dL o LDL > 200 mg/dl o Trigliceridi > 500 mg/dl
- Anamnesi familiare (prematuri eventi cardiovascolari nei parenti di I grado)
- Esame obiettivo: xantomi a livello delle articolazioni e tendine d'Achille, xantelasma palpebrali, arco corneale (deposito di colesterolo a livello della cornea)
- Esclusione di forme secondarie

Tipo di dislipidemia	Lipidi elevati mmol/l (mg/dl)	Segni clinici
Ipercolesterolemia pura		
Ipercolesterolemia poligenica comune	CT 6,5-9,0 (250-350)	Forma molto comune In genere asintomatica fino a comparsa di malattia vascolare; xantomi assenti
Ipercolesterolemia familiare <ul style="list-style-type: none"> • Forma eterozigote 	CT 7-13 (275-500)	Forma con prevalenza 1/500 circa Elevato rischio di cardiopatia ischemica in età media; xantomi presenti nell'adulto
<ul style="list-style-type: none"> • Forma omozigote 	CT > 13 (> 500)	Forma con prevalenza 1/1.000.000 Malattie vascolari e xantomi e nell'infanzia
Ipertrigliceridemia pura		
Ipertrigliceridemia familiare	TG 2,8-8,5 (250-750)	Forma con prevalenza 1/1000 circa Possibile rischio aumentato di vasculopatie; rischio di pancreatite
Deficit familiare di lipoprotein-lipasi o di apo CII	TG > 8,5 (> 750) (plasma lattescente)	Forma con prevalenza 1-2/1.000.000 circa Possibile associazione con pancreatite ed epatosplenomegalia
Ipertrigliceridemia + Ipercolesterolemia		
Iperlipidemia familiare combinata	TG 2,8-8,5 (250-750) CT 6,5-13,0 (250-500)	Molto comune con prevalenza 1/100 circa. Rischio elevato di cardiopatia ischemica; la forma familiare può manifestarsi anche con aumento isolato di TG o di colesterolo-LDL

Xantelasma palpebrali

Xantomi tendine d' Achille

Arco corneale

Xantomi mani

Per tutti, in prevenzione e trattamento

- Attività fisica e controllo del peso corporeo e della circonferenza addominale
- Dieta mediterranea
- Evitare alcolici
- No fumo
- Monitoraggi della pressione arteriosa (<140/90 mmHg)
- Limitare il consumo di sale

DIETA MEDITERRANEA

- Sì: pane integrale, frutta e verdura di stagione sia fresca che cotta, legumi (piselli, ceci, lenticchie), pesce lesso, carne bianca, olio extravergine di oliva, latte scremato, yogurt magro. Raccomandate cotture al vapore, alla griglia (facendo attenzione), bolliture.
- Con moderazione: pane e pasta raffinati, biscotti, patate, gelatina di pasta/carne, frutta secca, frutta in scatola, sorbetti, formaggi (da preferire quelli freschi), uova, carni rosse, molluschi e crostacei, maionese, ketchup, margarina vegetale
- Occasionalmente: dolci (torte, brioches, merendine), verdure preparate al burro o crema, gelati, insaccati, salumi, salse, hamburger, carni d'organo, formaggi stagionati, yogurt con pezzi di frutta, margarina, arachidi, cibi fritti.

Fare esercizio fisico; Consumare i pasti in famiglia o con gli amici

PIRAMIDE ALIMENTARE TRANSCULTURALE

Uno strumento di educazione alimentare
per tutti i bambini sin dall'età prescolare.

Società
Italiana di
Pediatria

DOLCI-SNACK (consumo al minimo)

patatine fritte, platano fritto, cioccolato nachos, patate dolci stufate, frittelle di mele, dulce de leche, budino di riso, banane verdi stufate

CONDIMENTI (consumo al minimo)

utilizzo giornaliero dell'olio di oliva

UOVA, TUBERI E RADICI

1-2 porzioni settimanali

FORMAGGI

2 porzioni settimanali

CARNE

Max 3 porzioni settimanali. Pollo, tacchino, vitello, manzo magro, maiale magro, agnello, coniglio, anatra

PESCE

3-4 porzioni settimanali. Alici, sardine, calamari, merluzzo, gamberi

LEGUMI

4-5 porzioni settimanali. Fagioli, lenticchie, piselli, ceci, soia, fave

NOCI-SEMI

1 porzione al giorno

LATTE-YOGURT

1-2 porzioni al giorno

CEREALI

3-5 porzioni al giorno. Grano, mais, farro, orzo, sorgo, miglio, grano saraceno, quinoa, (preferire cereali integrali), riso parboiled

FRUTTA-ORTAGGI

3-5 porzioni al giorno (varietà di colori e di consistenza). Pomodori, melanzane, okra, carote, germogli di bambua, squash, umele, arance, albicocche, guava, ciliegie, lichis, frutto della passione, mango, papaya

ACQUA

Assunzione giornaliera adeguata

ATTIVITA' FISICA-ADEGUATO RIPOSO

Convivialità, biodiversità e stagionalità, prodotti locali ed ecologici

TIPICITÀ

REGIONI AFRICANE

CEREALI: left, sorgo

VERDURA E FRUTTA: okra, foglie di cassava, foglie del baobab, frutto della passione, frutto del baobab, guava, mango

REGIONI ASIATICHE

CEREALI: miglio, grano saraceno

VERDURA E FRUTTA: okra, germogli di bambua, alghe marine, frutto del drago, lichis

REGIONI SUD AMERICA

CEREALI: quinoa, amaranto

VERDURA E FRUTTA: squash, okra, mango, fichi d'india, guava, melagrano

REGIONI MEDITERRANEE

CEREALI: grano duro (pasta, burghul, cous cous), grano tenero, farro

VERDURA E FRUTTA: pomodori, insalata, zucchine, mele, arance, albicocche

ABITUDINI VOLUTTUARIE

ALCOLICI

- Meglio evitarli
- “Moderate alcohol consumption [≤ 10 g/day (1 unit) for men and women] is acceptable for those who drink alcoholic beverages, if TG levels are not elevated”¹
- 1 Unità Alcolica = 10 gr di etanolo, quantità contenuta in 125 ml di vino di media gradazione
- Il 7% degli ipertesi guarirebbero con la sola sospensione dell'alcol

FUMO

- “Smoking cessation has clear benefits regarding overall CV risk and specifically on HDL-C level”¹

ESERCIZIO FISICO

- Ormai dimostrato che sovrappeso, obesità, eccesso di adipe addominale contribuiscono ad aumentare il colesterolo-LDL e di conseguenza il rischio cardiovascolare
- Obiettivo: BMI compreso tra 20-25 kg/m²
- Circonferenza addominale < 94 cm negli uomini e < 80 cm nelle donne
- Per ridurre il peso utile perdere circa 300-500 Kcal/giorno
- *NEJM (New England Journal of Medicine) 2002, 347: 1483-1492*: riduzione di apporto calorico di 1000/1500 Kcal/settimana si traduce in un aumento del Colesterolo-HDL del 7-10%

ESERCIZIO FISICO

- “It is always appropriate to advise people with dyslipidaemia to engage in regular physical exercise of moderate intensity for ≥ 30 min/day, even if they are not overweight”¹
- 30 minuti di camminata al giorno alla velocità di 5 km/h consentono di mantenere un corretto peso corporeo o correggere un sovrappeso

il meno possibile

guardare la TV,
usare il computer
e i videogiochi,
stare seduti per
più di 30 minuti

**2-3 volte
a settimana**

attività
ricreative
golf,
bowling,
giardinaggio

esercizi
muscolari

stretching, yoga,
flessioni, piegamenti,
sollevamento pesi

**3-5 volte
a settimana**

esercizi aerobici
(almeno 20 minuti)
nuotare, camminare
a passo svelto,
andare in bicicletta

attività ricreative
(almeno 30 minuti)

calcio, tennis,
basket, arti marziali,
ballo, escursioni

**ogni giorno
il più possibile**

passeggiare con il cane, scegliere strade più lunghe,
fare le scale invece che prendere l'ascensore,
camminare per andare a fare la spesa, fare giardinaggio,
posteggiare la macchina lontano da casa

ATTENZIONE AL SALE! NaCl

- Contiene il sodio che favorisce l'aumento della pressione arteriosa
- OMS raccomanda di non superare i 2 grammi di sodio al giorno
- 2 grammi di sodio = 5 grammi di sale da cucina
- 5 grammi di sale da cucina = sale contenuto in un cucchiaino da tè
- Attraverso l'alimentazione spesso si eccede la quantità di sale raccomandata, più spesso la si raddoppia! (4 grammi di sodio)
- Sale: 54% cibi conservati, consumati fuori casa, precotti
 - 36% sale da cucina
 - 10% cibi freschi

Attenzione al consumo di sale

- *basta una pizza* per raggiungere la quantità limite giornaliera (2 grammi)
- *se invece di un panino con un salume crudo* se ne sceglie uno con pomodoro e mozzarella si risparmia circa 1 grammo di sodio
- *se per la pasta e legumi* si usano i legumi freschi o secchi invece di quelli in barattolo si può evitare fino a mezzo grammo di sodio.
- attenzione a pane, cracker e grissini: non sono fra gli alimenti più ricchi di sodio, ma ne possono apportare molto perché nell'arco della giornata se ne mangiano più porzioni.
- Pane iposodico consigliato!

Se la terapia dietetica e comportamentale non bastano a ridurre il rischio cardiovascolare si mantiene elevato si ricorre alla **terapia farmacologica**, impostata dal Medico di Famiglia o dallo Specialista

- **Il cardine è rappresentato dalle statine**, farmaci che inibiscono la sintesi di colesterolo a livello del fegato ed hanno ruolo antinfiammatorio a livello endoteliale
- Simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, pravastatina, fluvastatina, lovastatina
- **Effetti collaterali più comuni: dolori muscolari, articolari, possibile rialzo di enzimi epatici (transaminasi) e di proteine espressione di lisi muscolare (CPK)**
- **Fibrati** (fenofibrato, bezafibrato, gemfibrozil): inibiscono l'assorbimento intestinale di grassi
- **Ezetimibe**: inibisce l'assorbimento intestinale del colesterolo alimentare e di quello contenuto nella bile. Può essere utilizzato singolarmente o in associazione con le statine, soprattutto quando quest'ultime non sono tollerate.
- **Omega 3** (Omega polienoici – esteri etilici di acidi grassi polinsaturi): riducono elevati livelli di trigliceridi (limitazioni prescrittive)
- **Nuove frontiere: PCSK9** (proteina della convertasi subtilisina/Kexin tipo 9) Evolocumab, Alirocumab > abbattano i livelli di colesterolo LDL (farmaci per via iniettiva che richiedono piano terapeutico dello specialista) nelle forme di ipercolesterolemia familiare refrattarie alle statine

Ed i nutraceutici?

- **BERBERINA**: presente in diverse piante della famiglia delle Berberidaceae. Agisce aumentando la captazione a livello plasmatico delle LDL favorendo la loro internalizzazione. Può essere utilizzata da sola oppure abbinata ad una statina
- **RISO ROSSO**: prodotto della fermentazione del comune riso da cucina da parte del lievito *Monascus Purpureus*. I prodotti sono detti Monacoline e la Monacolina K rappresenta a tutti gli effetti una statina naturale (analoga della lovastatina 10 mg). Studi dimostrano una riduzione del Colesterolo totale del 17-29% e del Colestolo-LDL del 24-40% a seconda dei dosaggi (20-80 mg/die)¹. Possibili gli stessi effetti collaterali della statina.
- **STEROLI VEGETALI – FITOSTEROLI**: contenuti nella frutta a guscio (noci, mandorle, nocciole, pistacchi), in oli vegetali, grano saraceno, crusca, verdure e legumi. Possono determinare un abbassamento del colesterolo LDL
- Policosanoli, polifenoli, aglio, probiotici

Quando ricorrere al nutraceutico?

- Rischio cardiovascolare è basso
- Difficoltà nell'adottare un corretto stile di vita
- In associazione alla dieta come stimolo ed incoraggiamento a perseverare con un corretto stile di vita
- “Resistenza” o “intolleranza” al trattamento farmacologico
- Scarsa adesione e timore di assumere il farmaco
- In associazione alla statina per aumentarne l'effetto senza aumentare il dosaggio farmacologico

Take home message!

- Il metabolismo dei grassi è molto complesso
- Non soffermarsi ai valori numerici di colesterolo e trigliceridi all'esame del sangue, ma utilizzarli per calcolare il rischio cardiovascolare, senza dimenticare le forme secondarie e quelle familiari.
- Si tratta la persona, non la carta!
- In base al rischio cardiovascolare ed alla storia clinico-familiare di ciascuna persona il Medico potrà consigliare la condotta e/o la terapia più adeguata
- Importanza della dieta mediterranea e dell'attività fisica per tutti

<http://www.cuore.iss.it>

Grazie dell'attenzione!